



FICHA TÉCNICA

AZIUM®

Registro ICA No. 1994-DB

USO VETERINARIO



COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Dexametasona	2 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES

Como coadyuvante en afecciones de tipo alérgico e inflamatorio, de etiología no infecciosa.

En **Bovinos**, para el tratamiento de la cetosis primaria.

En **Equinos**, para el tratamiento de inflamaciones osteomusculares tales como bursitis, carpitis, periostitis del tercer metacarpiano o de la primera falange, tendinitis y miositis. No deben esperarse resultados con AZIUM® en los casos en que existan deformaciones óseas en cualquiera de estas afecciones, articulaciones o estructuras relacionadas.

En **Perros y Gatos**, como tratamiento concomitante, puede utilizarse en las dermatosis no específicas tales como eczema de verano y alopecia. La enfermedad primaria deberá determinarse e instituirse el tratamiento adecuado para su corrección. El prurito que acompaña estos estados generalmente desaparece en unas pocas horas, seguido de regresión de lesiones inflamatorias.

AZIUM® puede administrarse a animales con infecciones bacterianas agudas o crónicas siempre que éstas estén controladas con antibióticos de acción bactericida.

ESPECIE DESTINO

Bovinos, Caninos, Equinos y Felinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos: Adminístrese 2.5 a 10 mL (5 - 20 mg) por vía intramuscular o intravenosa.

Equinos: Adminístrese 1.25 a 2.5 mL (2.5 - 5 mg) ml por vía intramuscular o intravenosa.

Caninos: Adminístrese 0.1 a 0.5 mL (0.25 - 1 mg) por vía intramuscular o intravenosa.

Felinos: Adminístrese 0.1 a 0.3 mL (0.125 - 0.5 mg) por vía intramuscular o intravenosa.

La frecuencia y duración del tratamiento en estas especies serán según criterio del Médico Veterinario.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No deberá administrarse en animales con infecciones virales.

No administrarse en animales gestantes, en el último tercio de la gestación.



TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

2

ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 30°C.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La dosis de AZIUM[®], al igual que con cualquier otro corticosteroide, deberá individualizarse de acuerdo con la severidad de la afección que está siendo tratada, la anticipada duración de la terapia con corticosteroide y la capacidad o tolerancia del animal para recibir dosis excesivas de corticosteroide.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos viales por 10 mL y 50 mL

FABRICADO POR

Trirx Segre

Francia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia