



FICHA TÉCNICA

BERENIL®

Registro ICA No. 154-DB

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Diaminazina clorhidrato	70 mg
Excipientes c.s.p	1 mL



INDICACIONES

Tratamiento de Babesiosis en bovinos, ovinos y equinos y Tripanosomiasis en bovinos.

ESPECIE DESTINO

Bovinos, ovinos y equinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar 1 mL de la solución lista para el uso, por cada 20 kg de peso.

Vía intramuscular profunda.

Una sola aplicación.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 20 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 2 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 30°C

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 20 mL y 100 mL

FABRICADO POR

Intervet International GmbH
Alemania

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

2