



FICHA TÉCNICA

CHORULON®

Registro ICA No. 4338

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Una vez reconstituido, cada mL de solución contiene:

Gonadotropina Coriónica

300 UI*

Excipientes c.s.p

1 mL

UI: Unidades Internacionales

INDICACIONES

Inducción de la ovulación en yeguas, perras, cerdas (adultas y nulíparas) y hembras de peces. Tratamiento de quistes foliculares en vacas y novillas.

ESPECIE DESTINO

Bovinos, equinos, perros y peces.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para reconstituir

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Especie	Indicaciones	Dosificación y administración
Bovinos (vacas, novillas)	Mejora la tasa de concepción	1500 UI IM ó IV en el momento de la IA/cubrición y/o 6 días más tarde
	Inducción de la ovulación de quistes foliculares	3000 UI IV
Cerdas adultas y nulíparas	Inducción de la ovulación	500 a 700 UI IM 24 horas antes o en el momento de la primera IA
Hembras de peces	Inducción del desove	200 a 4000 UI/kg pv según especies, IM o IP
Yeguas	Inducción de la ovulación $\geq 3,5$ cm de diámetro	1500 - 3000 UI IM ó IV, 24 horas antes de la IA o cubrición
Perras	Inducción de la ovulación para tratar el anestro	Después del pre-tratamiento con gonadotropina sérica de yegua preñada, administrar 500 UI IM ó IV el primer día del celo.
	Ovulación retardada, estro prolongado	100 - 800 UI/día IM, repetir el tratamiento hasta que desaparezca el flujo vaginal



Administrar por vía intramuscular, intravenosa o intraperitoneal (ésta última, sólo en peces).

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

En casos raros, como en todos los preparados proteínicos, pueden aparecer incidentes de tipo anafiláctico inmediatamente después de la inyección. Si aparecen los síntomas, administrar adrenalina (1:1000) por vía intravenosa o intramuscular como tratamiento estándar. La administración de corticosteroides también puede estar indicada.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días

ALMACENAMIENTO

No almacenar a temperaturas superiores a 25°C.

Tras la reconstitución, el producto puede almacenarse a 2 - 8°C durante un máximo de 24 horas

ADVERTENCIAS

Si usted observa cualquier efecto adverso, por favor comuníquelo a su veterinario.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 1.500 U.I. acompañado de diluyente.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.
Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia