

FICHA TÉCNICA

CIRCUMVENT® PCV M

Registro ICA No. 9131-BV

USO VETERINARIO

Organismo Genéticamente Modificado

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna de Circovirus Porcino Tipo 2, Vector Baculovirus inactivado, Bacterina inactivado, Bacterina *Mycoplasma hyopneumoniae*

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL de vacuna contiene:

Antígeno subunitario ORF2 de Circovirus Porcino Tipo 2 ≥ 1.3 PR*

Mycoplasma Hyopneumoniae, Cepa 11 ≥ 1.2 PR*

Excipientes c. s. p. 2 mL

PR: Potencia relativa



INDICACIONES

Como prevención de la viremia, como una ayuda en la reducción de la replicación viral causada por el Circovirus Porcino Tipo 2, y como una ayuda en el control de la neumonía causada por *Mycoplasma Hyopneumoniae*.

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (16°C a 27°C (60° a 80°F)).

Agite bien y administre una dosis intramuscular de 2.0 mL a cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores, seguido de una segunda dosis de 2.0 mL, 3 semanas después, para el desarrollo de la inmunidad.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Utilice después de abierto. No guarde restos de vacuna.

Utilice solo en cerdos sanos.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C - 8°C protegido de la luz. No congelar.



ADVERTENCIAS:

Evitar la inyección accidental de manos, dedos y otras partes del cuerpo. La inyección accidental puede causar reacciones locales serias. Contacte con un médico inmediatamente.

2

Tome en cuenta que las reacciones locales pueden ocurrir en los sitios de inyección, las cuales, y la mayoría de las reacciones se resuelven de 16 a 23 días después de la vacunación.

Algunas reacciones sistémicas pueden presentarse después de la vacunación.

Si ocurre una reacción alérgica, utilice epinefrina.

La disposición del envase y producto no utilizado se debe realizar de acuerdo con la normativa vigente al respecto en el país.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 50 mL (25 dosis), 100 mL (50 dosis), 200 mL (100 dosis) y 500 mL (250 dosis)

FABRICADO POR

Intervet Inc.

Estados Unidos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia