



FICHA TÉCNICA

CIRCUMVENT® PCV

Registro ICA No.7929-BV

USO VETERINARIO

Organismo Genéticamente Modificado

DESCRIPCIÓN

Vacuna de Circovirus Porcino Tipo 2, Vector Baculovirus, Inactivado

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL contiene:

Antígeno subunitario ORF2 de Circovirus Porcino Tipo 2

≥ 1.0 PR*

Excipientes c.s.p.

2 mL

*PR: Potencia Relativa



INDICACIONES

Para uso en cerdos como prevención de la viremia, y como una ayuda en la reducción de la replicación viral causada por el Circovirus Porcino tipo 2.

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Agite bien y administre una dosis intramuscular de 2.0 mL a cerdos sanos, de 3 semanas de edad o mayores, seguido de una segunda dosis de 2.0 mL, 3 semanas después, para el desarrollo de la inmunidad.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Utilice después de abierto. No guarde restos de vacuna.

Utilice solo en cerdos sanos.

TIEMPO DE RETIRO

No vacunar 21 días previos al sacrificio

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C - 8°C protegido de la luz. No congelar.



ADVERTENCIAS

Evitar la inyección accidental de manos, dedos y otras partes del cuerpo. La inyección accidental puede causar reacciones locales serias. Contacte un médico inmediatamente. Algunas reacciones sistémicas pueden presentarse después de la vacunación. Si ocurre una reacción alérgica utilice epinefrina.

La disposición del envase y producto no utilizado se debe realizar de acuerdo con la normativa vigente al respecto en el país.

2

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 100 mL (50 dosis), 200 mL (100 dosis) y 500 mL (250 dosis)

FABRICADO POR:

Intervet Inc

Estados Unidos

IMPORTADO POR:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia