

FICHA TÉCNICA

COBACTAN® LC

Registro ICA No. 4950-DB
USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Cefquinoma Sulfato	75 mg
Excipientes c. s. p	8 g

INDICACIONES

Tratamiento intramamario contra mastitis clínica causada por *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae* y *Escherichia coli*.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión Intramamaria

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar el contenido de una jeringa en el canal del pezón de cada cuarto infectado, cada 12 horas hasta completar 3 aplicaciones. Vaciar el cuarto infectado antes de la aplicación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 25 °C

INSTRUCCIONES DE USO

Lavar y desinfectar muy bien el cuarto y el pezón.

Introduzca suavemente el contenido del tubo en el cuarto infectado.

Haga un masaje suave del pezón y la ubre para favorecer la dispersión del producto.

PRECAUCIONES

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 2 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo, no debe destinarse para el consumo humano



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa por 8g. (Caja por 3 jeringas)

FABRICADO POR:

Intervet International GmbH
Alemania

IMPORTADO POR:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia