

FICHA TÉCNICA

COBACTAN®

Registro ICA No. 4035-DB

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión inyectable contiene:

Cefquinoma sulfato (Equivalente a 25 mg de Cefquinoma base)	29,64 mg
Excipientes c.s.p	1 mL



INDICACIONES

En bovinos y porcinos, para el tratamiento de las enfermedades bacterianas pulmonares y de las vías respiratorias provocadas por *Pasteurella multocida*, *Manheimia haemolytica*, *Haemophilus parasuis* y *Actinobacillus pleuroneumoniae*. Para el tratamiento de las enfermedades producidas por *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Escherichia coli*, *Pseudomona sp.*, *Klebsiella sp.*, *Corynebacterium sp.*, *Proteus sp.*, *Fusobacterium* y *Bacteroides sp.*

ESPECIE DESTINO

Bovinos y porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

En bovinos: 2 mL por cada 50 Kg de peso, lo cual equivale a suministrar 1 mg de cefquinoma por Kg de peso. Suministrar esta dosis diariamente por 3 a 5 días vía intramuscular.

En porcinos: para enfermedades respiratorias, 1 a 2 mL por cada 25 Kg de peso, lo cual equivale a suministrar 1 - 2 mg de cefquinoma por Kg de peso, vía intramuscular durante 3 días consecutivos. Síndrome M.M.A.: Aplicar 2 mL por cada 25 Kg de peso, lo cual equivale a suministrar 2 mg de cefquinoma por Kg de peso. Suministrar esta dosis diariamente durante 2 días consecutivos, vía intramuscular.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Una vez perforado, utilizar el resto del contenido en un plazo de cuatro semanas.

TIEMPO DE RETIRO

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.



Los cerdos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 2 días después de finalizado el tratamiento

ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de 25° C. Proteger de la luz.

2

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Los envases vacíos o parcialmente usados deben ser desechados acorde con la legislación local.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 50mL y 100mL

FABRICADO POR:

Intervet International GmbH
Alemania

IMPORTADO POR:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia