



FICHA TÉCNICA

COCCIVAC® -D2

Registro ICA No. 10745-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna viva contra la coccidiosis. Oocistos vivos.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna viva contiene:

<i>Eimeria acervulina</i>	≥ 600 Oocistos
<i>Eimeria maxima</i>	≥ 200 Oocistos
<i>Eimeria necatrix</i>	≥ 400 Oocistos
<i>Eimeria brunetti</i>	≥ 200 Oocistos
<i>Eimeria mivati</i>	≥ 400 Oocistos
<i>Eimeria tenella</i>	≥ 200 Oocistos
Excipientes c.s.p.	1 dosis

INDICACIONES

En pollitas de reemplazo (ponedoras comerciales y reproductoras) para la prevención de la coccidiosis mediante el desarrollo de inmunidad contra las coccidias *E. acervulina*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. tenella*, *E. necatrix* y *E. brunetti*.

ESPECIE DESTINO

Aves

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral o para uso en cámara de nebulización

DOSIS, VÍA y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Coccivac-D2 debe ser administrada mediante cámara de nebulización al primer día de edad o en el alimento a los 4 días de vida.

Administración por aspersión en el alimento para vacunación de las pollitas al 4 día de edad

1. No usar ninguna medicación ni desinfectante en el agua de bebida durante, ni 24 horas antes o después de la vacunación.
2. Diluya la vacuna en una proporción de 1000 dosis en 400 mL de agua sin cloro, mezcle bien y coloque en un rociador de presión o aspersor limpio. Verter el contenido de un frasco de vacuna dentro del agua y enjuagar el frasco en ésta.
3. Rocíe la vacuna diluida sobre la superficie del alimento, agitando el rociador durante la administración.
4. Para un mejor resultado, la vacuna debe ser rociada sobre todo el alimento.



5. Evite humedecer excesivamente el alimento, una apropiada aplicación debe humedecer solamente la superficie del alimento.
6. Permita que las aves tengan el suficiente tiempo para ingerir los oocistos en el alimento (alrededor de 24 horas), antes de agregar más comida.

2

Administración por método de aspersión para vacunación de las pollitas al día de edad

1. Usar 210 mL de agua destilada cada 1.000 dosis.
2. Agregue 1 mL de colorante rojo por cada 1.000 dosis.
3. Colocar sobre el agitador magnético que viene con el sistema Spraycox para mantener la suspensión en forma uniforme.
4. Ajustar la máquina como se indica por el fabricante del sistema.
5. Usando la cabina de rociador, cada caja de 100 pollitas recibirá 21 mL de la dilución.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

1. Vacunar únicamente pollitas sanas
2. Las aves pueden ser criadas en papel, pero éste se debe retirar y las pollitas pasar a la cama al cuarto día después de la vacunación y tener acceso a sus heces, ya que la reinfección es necesaria para adquirir la inmunidad. Las aves criadas en jaula de alambre no serán eficientemente inmunizadas.
3. Las pollitas criadas en baterías solo se pueden inmunizar de modo efectivo, con Coccivac®-D2, si son colocadas en la cama a más tardar 4 días después de la vacunación.
4. La humedad es necesaria para que los oocistos esporulen, si las condiciones de la cama son extremadamente secas durante el periodo de inmunización, se recomienda rociarla ligeramente con agua. Si la vacuna produce una reacción notable, ésta suele ocurrir entre los 12 y 14 días después de la vacunación. No trate para coccidiosis a menos que la elevada morbilidad o mortalidad sean atribuidas a coccidiosis. Una vez hecho un diagnóstico positivo, trate con un anticoccidial en el agua de bebida, medicando por 48 horas, usando la dosis más baja recomendada por el fabricante.
5. Una vez abierto el vial, use todo el contenido.

Esta vacuna contiene gentamicina como agente conservador.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición de frascos y todo contenido sobrante debe realizarse acorde con la legislación local.

Uso de Alimento Medicado y Coccivac® -D2

La vacuna Coccivac®-D2 no se recomienda para usar en aves que reciben alimento con coccidiostato o niveles altos de antibióticos.

Después de la vacunación puede ser necesario usar niveles altos de medicamentos para el tratamiento de enfermedades diferentes a coccidiosis; si se usan drogas con actividad coccidicida en la primera o segunda semana después de la vacunación con Coccivac®-D2, se recomienda revacunar.

La capacidad de Coccivac®-D2 para producir óptimos resultados depende de muchos factores, incluyendo las condiciones de manejo, almacenamiento, administración de la vacuna, salud y capacidad de respuesta inmune de las aves, lo mismo que el grado de exposición en el campo. Por lo tanto se deben seguir las instrucciones con extremo cuidado.



ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C a 8°C

No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 1000 dosis y 5000 dosis. Caja por 10 frascos.

FABRICADO POR

Intervet Inc.

Estados Unidos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia

3