

## FICHA TÉCNICA

### COOPERSOL®

Registro ICA No. 3584-DB  
USO VETERINARIO



1

#### COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contienen:

Fosfato de Levamisol	22.3 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

#### INDICACIONES

En bovinos, ovinos y porcinos para el tratamiento del parasitismo gastrointestinal y pulmonar por: *Ostertagia sp*, *Haemonchus sp*, *Trichostrongylus sp*, *Bunostomum sp*, *Cooperia sp*, *Oesophagostomum sp*, *Chabertia sp*, *Nematodirus sp*, *Dictyocaulus spp* y *Metastrongylus sp*.

#### ESPECIE DESTINO

Bovinos, Ovinos, Porcinos

#### FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar por vía subcutánea o intramuscular 1 mL por cada 50 kilos de peso vivo de acuerdo a la siguiente tabla:

PESO ANIMAL	DOSIS
50 kg	1mL
100 kg	2mL
200 kg	4mL
300 kg	6mL
400 kg	8mL

#### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No someter los animales a ejercicios prolongados antes o después del tratamiento.

#### PRECAUCIONES

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes



### **TIEMPO DE RETIRO**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 4 días después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano.

2

### **ALMACENAMIENTO**

Almacenar por debajo de 30°C, protegido de la luz sola

### **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 100, 250 y 500 mL

#### **FABRICADO POR**

Laboratorio Microsules  
Uruguay

#### **IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.  
Bogotá, Colombia