

FICHA TÉCNICA

DEPOMICINA® 20/20

Registro ICA No. 4335-DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión acuosa contiene:

Penicilina G procaínica	200.000 UI
Dihidroestreptomicina (sulfato)	200 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

INDICACIONES

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y perros, para el tratamiento de infecciones producidas por *Streptococcus sp.*, *Bacillus anthracis*, *Erysipelothrix sp.*, *Fusobacterium sp.*, *Listeria sp.*, *Neocardia sp.*, *Leptospira sp.*, *Actinomyces sp.*, *Campylobacter sp.*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Klebsiella sp.*, *Staphylococcus sp.*

ESPECIE DESTINO

Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Caninos y Caprinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión acuosa inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

10.000 UI de Penicilina Procaínica y 10 mg de dihidroestreptomicina, lo cual equivale a suministrar:

Bovinos, equinos, ovinos y porcinos: 1 mL por cada 20 Kg de peso

Perros: 0.5 mL-1mL/10 Kg de peso

Según el caso clínico, puede duplicarse la dosis.

Aplicar vía intramuscular cada 24 horas durante 3-5 días.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Agitar antes de usar.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo, no debe darse a consumo humano.



ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C-8°C

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 100 mL y 250 mL

FABRICADO POR

Intervet Productions S.r.l

Italia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia

2