

## FICHA TÉCNICA

### DORACUR®

Registro ICA No. 10549-MV

USO VETERINARIO



### COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución inyectable contienen:

Doramectina

1.0 g

Excipientes c. s. p.

100 mL

### INDICACIONES

#### Bovinos:

Esta indicado para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales y pulmonares, garrapatas, miasis (gusanera), larvas, piojos, ácaros de la sarna.

#### Helmintos gastrointestinales (adultos y larvas de 4° estadio):

*Ostertagia ostertagi*, *Haemonchus spp.*, *Haemonchus contortus* (adultos), *Haemonchus similis* (adultos), *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata* (adultos), *Cooperia spp.*, *Bunostomum phlebotomum* (adultos), *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus* (adultos), *Trichuris spp.* (adultos).

#### Helmintos pulmonares:

*Dictyocaulus viviparus*.

#### Garrapatas:

*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

#### Larvas:

*Dermatobia hominis*.

#### Miasis (gusaneras cutáneas)

Larvas de la mosca *Cochliomyia hominivorax*

#### Piojos:

*Linognathus vituli*, *Haematopinus eurytarnus*, *Solenopotes capillatus* y *Damalinea bovis*.

#### Ácaros:

*Psoroptes ovis*.

#### Porcinos:

Esta indicado para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y renales, piojos y ácaros de la sarna.

#### Helmintos gastrointestinales (adultos y larvas de 4° estadio):

*Hyostrogylus rubidus*, *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi* (adultos), *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis*.

#### Helmintos pulmonares:

*Metastrongylus spp.*



Helmintos renales (adultos):

*Stephanurus dentatus*

Piojos:

*Haematopinus suis*

Ácaros:

*Sarcoptes scabiei*.

2

**ESPECIES DESTINO**

Bovinos y Porcinos

**FORMA FARMACÉUTICA**

Solución inyectable

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

**Bovinos:** Administrar Doracur® por la vía subcutánea en las dosis de 1,0 mL para cada 50 kg de peso corporal (200 mcg de doramectina por kg de peso corporal).

**Tabla de dosificaciones para bovinos**

Peso (Kg)	Dosis (mL)
Hasta 50 Kg	1
51 - 100	2
101 - 150	3
151 - 200	4
201 - 250	5
251 - 300	6
301 - 350	7
351 - 400	8
401 - 450	9
451 - 500	10
501 - 550	11
551 - 600	12

**Porcinos:** Administrar Doracur® por vía intramuscular en la dosis de 1 mL para cada 33 kg de peso corporal (300 mcg de doramectina por kg de peso corporal).

**Tabla de dosificaciones para porcinos**

Peso (Kg)	Dosis (mL)
Hasta 33 Kg	1,0
34 - 50	1,5
51 - 66	2,0
67 - 82	2,5
83 - 99	3,0



### **PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES**

No lo guarde o aplique junto con alimentos, bebidas, producto de higiene o productos domésticos;  
Ajuste la dosis de acuerdo con el peso para cada animal  
No administrar en bovinos cuya leche se destine al consumo humano.  
Volúmenes por encima de 5 mL preferiblemente deben dividirse en más de un sitio de aplicación.

3

### **TIEMPO DE RETIRO**

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano, hasta veintiocho (28) días después de finalizado el tratamiento.  
No ha sido establecido un tiempo de retiro para terneros, por lo tanto, no administrar en terneros destinados al consumo humano.

### **ALMACENAMIENTO**

Conservar entre 15°C y 30°C.  
No exponerlo a la luz.

### **ADVERTENCIAS**

Consulte al Médico Veterinario  
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario  
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

### **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 50 mL y 500 mL

### **FABRICADO POR**

VALLÉ S.A.  
Brasil.

### **IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.  
Bogotá, Colombia