

FICHA TÉCNICA

DUPLOCILLINA® L.A.

Registro ICA No. 4369-DB

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión acuosa contiene:

Penicilina G procaínica	150.000 UI
Penicilina G benzatínica	150.000 UI
Excipientes c. s. p	1 mL



INDICACIONES

En bovinos, equinos, porcinos, ovinos, perros y gatos, para el tratamiento de infecciones producidas por *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Bacillus anthracis*, *Erysipelothrix sp.*, *Clostridium sp.*, *Fusobacterium sp.*, *Listeria sp.*, *Nocardia sp.*, *Leptospira sp.*, *Actinomyces sp.*, *Actinobacillus sp.*, *Corynebacterium sp.*

ESPECIES DESTINO

Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, perros y gatos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión acuosa inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

10.000 UI de penicilina Procaínica y 10.000 UI de Penicilina Benzatínica, lo cual equivale a suministrar en:

Bovinos, equinos, porcinos y ovinos: 1 ml/15 kg de peso.

Perros y gatos: 0.5 ml/7 kg de peso.

Aplicación Intramuscular ó subcutánea. Repetir a los tres días si es necesario.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Agítese antes de usar

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C y 8°C

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos



TIEMPO DE RETIRO

Lo animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 30 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 6 días después de finalizado el mismo, no debe destinarse para el consumo humano.

2

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 50 mL, 100 mL y 250 mL.

FABRICADO POR

Intervet Productions S. r. l.
Italia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia