



FICHA TÉCNICA

EQUILIS® TE

Registro ICA No. 9635-BV

USO VETERINARIO

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 mL de toxoide contiene:

Toxoide tetánico	40 If*
Excipientes c.s.p	1 mL

*If: equivalentes de floculación (correspondiente con ≥ 30 UI/mL)



INDICACIONES

Para la inmunización activa de los caballos y ponies contra el tétanos.

Tétanos:

Aparición de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación primaria.

Duración de la inmunidad: 17 meses después de la vacunación primaria.

24 meses después de la revacunación.

ESPECIE DESTINO

Equinos (Caballos y ponis)

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyección intramuscular de una dosis (1 mL) por animal.

Tétanos:

Programa de vacunación primaria:

A todo caballo que no haya sido vacunado previamente se le deberán administrar dos vacunaciones de una dosis con un intervalo de 4 semanas. Los potros deben ser vacunados desde las 6 semanas de edad. Si la vacunación se lleva a cabo antes de los 6 meses de edad, se puede esperar una protección completa después de la tercera vacunación cinco meses después.

Revacunación:

La primera revacunación se administra 5 o 17 meses después de la vacunación básica, posteriormente, se recomienda un intervalo máximo de dos años entre cada revacunación.



Vacunación de emergencia: La vacuna se puede utilizar junto con el suero tetánico de para el tratamiento de caballos lesionados que no hayan sido inmunizados frente al tétanos. En ese caso, la primera dosis del programa de vacunación primaria puede ser administrada juntamente con la dosis profiláctica apropiada del Suero Tetánico en un lugar de inyección separado. La segunda dosis se puede administrar 4 semanas después tal como se describe arriba. Se recomienda repetir la inmunización contra tétanos después de 1 mes.

2

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No deben ser vacunados animales enfermos

No usar después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.

Utilice agujas y jeringa estériles para su aplicación.

Antes de aplicar permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente de 15-25° C, máximo 2 horas antes de su uso.

Deseche el frasco de acuerdo con la legislación local.

En caso de auto inyección accidental, consulta al médico inmediatamente y muestre el texto del envase o el prospecto

TIEMPO DE RETIRO

Cero días.

ALMACENAMIENTO

Consérvese en refrigeración entre 2°C y 8° C.

No congelar

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa pre-llenada unidosis y viales unidosis.

Cajas por 1, 5 o 10 jeringas. Caja por 10 viales.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia