

FICHA TÉCNICA

FINADYNE® Solución inyectable

Registro ICA No.2084 DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL contiene:

Flunixin Meglumina

82,95 mg

(Equivalente a 50mg de Flunixin)

Excipientes c.s.p

1 mL

INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de la inflamación y el dolor asociados con trastornos osteomusculares y para el alivio del dolor visceral asociado al cólico. Como coadyuvante en el tratamiento de inflamación, dolor y elevación de temperatura asociados con mastitis y metritis.

Finadyne® es eficaz para combatir la inflamación, el dolor y la fiebre, actuando en los sistemas orgánicos (vasculares, respiratorio, nervioso, gastrointestinal, reproductor y ocular) afectados por las prostaglandinas.

El control del dolor se consigue de 15 minutos a 2 horas después de la inyección, especialmente en cólicos.

ESPECIES DESTINO

Bovinos, Equinos y Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solucion inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos y Equinos: Vía intravenosa

Porcinos: Vía Intramuscular

Especies	Indicación	Dosis	Tratamiento Total
Equinos	Alteraciones músculo esqueléticas	1 x día hasta 5 días	1 ml/45 kg IV/IM
	Cólicos (dolor)	Si no hay mejoría con 2 dosis, puede estar Indicada una intervención quirúrgica	1 ml/45 kg IV (más rápido)
Bovinos	Mastitis Aguda	1-2 veces con intervalos de 12 horas	2 ml/45 kg IV/IM
	Dolor e inflamación (Vaca caída)	1-2 veces con intervalos de 12 horas	2ml/45kg IM profunda
Porcinos	MMA (Metritis, Mastitis, Agalactia)	Repetir a las 12 horas si es necesario	2 ml/45 kg IM profunda
	Cojeras	Hasta 3 tratamientos con intervalos de 24 horas	2 ml/45 kg IM profunda



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No usar durante las 48 horas anteriores al parto en bovinos.

El uso en el postparto inmediato puede interferir con la involución uterina y la expulsión de las membranas fetales ocasionando retención de placenta.

TIEMPO DE RETIRO

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento.

Los equinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 1 día después de finalizado el tratamiento.

Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 18 días después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo, no debe darse al consumo humano.

ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de 25°C

INFORMACIÓN ADICIONAL

Posee dos mecanismos de acción:

Bloquea la producción de prostaglandinas que a su vez son la causa principal de dolor, inflamación y fiebre.

Bloquea la acción de las prostaglandinas sobre células diana de los órganos efectores.

ADVERTENCIAS:

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

FINADYNE Solución inyectable es envasado en viales de dosis múltiples de 10, 20,30,50,80,100 y 200 ml en cajas individuales

FABRICADO POR

Trirx Segre

Francia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia