



## FICHA TÉCNICA

### GARAFOS<sup>®</sup> C

Registro ICA No. 905-DB  
USO VETERINARIO



1

#### COMPOSICIÓN

Cada 100 g de concentrado emulsionable contienen:

Ethion	83 g
Excipientes c.s.p.	100 g

#### INDICACIONES

En bovinos, para el control de  
Garrapatas:

*Rhipicephalus microplus*, *Amblyomma cajennense*

Piojos:

*Haematopinus sp.*, *Linognathus sp.*, *Trichodectes sp.*

Moscas:

*Haematobia sp.*, *Stomoxys sp.*

#### ESPECIE DESTINO

Bovinos

#### FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión tópica

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Preparar el producto diluido en agua a una dosis de 1 litro de la dilución por cada 100 kilos de peso así:

**Tanques de aspersión:** Mezclar 1 litro de GARAFOS<sup>®</sup> C por cada 1300 litros de agua.

**Bombas de mano:** Agregar 15 mL de GARAFOS<sup>®</sup> por cada 2 litros de agua. Generalmente, cuando se utilizan bombas de mano, un animal adulto requiere entre 4 y 5 litros de dilución.

#### INSTRUCCIONES DE USO

##### Tratamiento rutinario contra garrapatas

En caso de *Rhipicephalus microplus* (garrapata de un solo huésped), bañar cada 21 días. En infestaciones graves bañar cada 10 días, hasta obtener un buen control. Después, continuar bañando cada 21 días.

En caso de *Amblyomma cajenense* (garrapata de tres huéspedes), bañar cada 7 días.



### Tratamiento contra moscas y piojos

En las épocas de poblaciones altas, bañar cada 21 días.

### TIEMPO DE RETIRO

Lo animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días, después finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 24 horas después de finalizado el mismo no debe darse para consumo humano.

### INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto accidental con la piel y os ojos lavar con agua y jabón, báñese y cambie de ropa una vez finalizado el trabajo.

### ANTÍDOTO: Sulfato de atropina

**Humanos:** Aplicar por vía intramuscular 1 a 2 mg cada hora hasta un máximo de 10 a 20 mg por día.

**Ganado:** Aplicar por vía intramuscular o sub intravenosa 20 a 30 mg. Repetir a intervalo si es necesario.

### ALMACENAMIENTO

Manténgase el envase bien tapado en lugar ventilado a temperatura inferior a 30° C.

### ADVERTENCIAS

#### CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA II - ALTAMENTE TÓXICO

No utilizar el envase para conservar alimentos o agua potable.

La disposición de los envases debe realizarse acorde con la política local.

### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Leer etiqueta ante de usar el producto.

Usar guantes de caucho y máscara al mezclar el producto.

No fumar ni comer durante la aplicación.

No arrojar producto a fuentes agua. Producto tóxico en peces.

Altamente tóxico para abejas. No aplicar en horas de alta actividad de abejas.

No utilizar producto en baños de inmersión.

No utilizar en animales con heridas abiertas.

No usar en otras especies animales.

No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o excipientes.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

### INFORMACIÓN ADICIONAL

“El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, mediante registro oficial de venta, se verificó que es apto para los fines aquí mencionados de acuerdo con las indicaciones de empleo”



**PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 235 mL o 1 L



FABRICADO POR:

**Schering -Plough Animal Health**

Estados Unidos

**Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.**

Brasil

IMPORTADO POR:

**MSD Salud Animal Colombia S.A.S.**

Bogotá, Colombia