



FICHA TÉCNICA

NAFPENZAL® DC

Registro ICA No. 2900-DB
USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada jeringa por 3 gramos contiene:

Penicilina G Procaínica	300.000 UI
Sulfato de Dihidroestreptomicina	100 mg
Nafcilina Sódica	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 jeringa



INDICACIONES

En bovinos en período seco, para el tratamiento y control de las mastitis subclínicas, producidas por *Streptococcus sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Arcanobacterium pyogenes* y *Escherichia coli*.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Supensión intramamaria

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar una jeringa por cada cuarto en el momento en que la vaca inicia el periodo seco.

Ordeñar bien la ubre hasta que quede completamente seca.

Realizar limpieza y desinfección del pezón.

Remover la tapa del extremo de la jeringa.

Introducirla en el canal del pezón y administrar lentamente el contenido.

Hacer masaje en el pezón y en cada cuarto para favorecer la dispersión del producto.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad conocida a antibióticos β -lactámicos o a la dihidroestreptomicina.

No utilizar en animales en lactancia.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después del parto no debe destinarse para el consumo humano.



ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 25°C.
No congelar.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
Manténgase fuera del alcance de los niños

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa por 3 gramos. Caja por 4 jeringas.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.
Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

2