



FICHA TÉCNICA

NOBILIS® COR4+IB+ND+EDS

Registro ICA No. 6655-BV

USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna inactivada contra infecciones por *Avibacterium paragallinarum*, virus de Bronquitis Infecciosa serotipo Massachusetts, Enfermedad de Newcastle y Síndrome de la Caída de Postura EDSV'76.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0.5 mL contiene:

<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa 083 (serotipo A)	≥ 1 DPP ₇₀ *
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa Spross (serotipo B)	≥ 1 DPP ₇₀ *
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa H-18 (serotipo C)	≥ 1 DPP ₇₀ *
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa 48 (serotipo variante tipo B)	≥ 1 DPP ₇₀ *
Virus de la Bronquitis Infecciosa, cepa M 41	≥ 2.0 Log ₂ HI
Virus del Síndrome de la Caída de Postura '76, cepa BC14	≥ 3.2 Log ₂ HI
Virus de la Enfermedad de Newcastle, cepa Clone 30	≥ 4.0 Log ₂ HI ó ≥ 50 Und. PD ₅₀
Excipientes c.s.p.	1 dosis

*DPP₇₀: 70% de la dosis de protección en pollas

INDICACIONES

Para la inmunización activa de las gallinas que reduzca las infecciones y los signos clínicos de Coriza Aviar causada por *Avibacterium paragallinarum* y para conseguir protección contra el virus de la Bronquitis Infecciosa cubierto por el serotipo Massachusetts, la Enfermedad de Newcastle y el Síndrome del Descanso de Puesta'76.

Los efectos protectores se han demostrado al menos durante el período de puesta.

ESPECIE DESTINO

Aves

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

DOSIS, VÍA y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Inyección subcutánea en la parte inferior del cuello de 0,5 mL de la vacuna, en gallinas de 14 semanas de edad en adelante y no más tarde de 4 semanas antes de la puesta.

Para conseguir una protección máxima contra Coriza Aviar, las aves se deben vacunar con Nobilis® Corovac-4 al menos 6 semanas antes de la vacunación con Nobilis® COR4+IB+ND+EDS.



Para conseguir un efecto de revacunación máximo contra la Bronquitis Infecciosa y la Enfermedad de Newcastle, las aves se deben preinyectar con vacunas de virus vivo al menos 4 semanas antes de la vacunación con Nobilis® COR4+IB+ND+EDS.

No es necesaria la preinyección para el Síndrome de la Caída de la Postura⁷⁶.

2

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Consejos para una correcta administración

Agítela bien antes del uso

Utilice jeringas y agujas estériles

Evite la posibilidad de contaminación

Vacune solo animales sanos en la parte inferior del cuello

Efectos Secundarios

Las aves pueden estar menos activas al día después de la vacunación, pero todos los animales retoman a la normalidad al día siguiente. Se puede dar una pequeña hinchazón transitoria en el lugar de la inyección en la mayoría de los animales en las cuatro primeras semanas posteriores a la vacunación, pero después este efecto desaparece gradualmente.

Aviso Especial

En espera de estudios de incompatibilidad, esta vacuna no se debe mezclar con otros productos médicos veterinarios.

En caso de autoinyección accidental, consulte inmediatamente asistencia médica y muéstrela al médico el inserto o la etiqueta del paquete.

Esta vacuna no está recomendada para aves en periodo de postura.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición de frascos y todo contenido sobrante debe realizarse acorde con la legislación local.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C y 8°C

Proteger de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 500 mL (1000 dosis)

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia