



FICHA TÉCNICA

NOBILIS® CORVAC 4

Registro ICA No. 6655-BV

USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna inactivada contra infecciones por *Avibacterium paragallinarum* en aves.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0.5 mL contiene:

<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa 083 (serotipo A)	≥ 1 DPP ₇₀ *
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa Spross (serotipo B)	≥ 1 DPP ₇₀ *
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa H-18 (serotipo C)	≥ 1 DPP ₇₀ *
<i>Avibacterium paragallinarum</i> , cepa 48 (serotipo variante tipo B)	≥ 1 DPP ₇₀ *

Excipientes c.s.p.

1 dosis

*DPP₇₀: dosis protectora del 70% de los pollos

INDICACIONES

Inmunización activa de pollas para reducir la infección y los signos clínicos causados por *Avibacterium paragallinarum*.

Se ha demostrado que la vacuna protege desde tres semanas hasta al menos 49 semanas después de su administración.

ESPECIE DESTINO

Aves

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

DOSIS, VÍA y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Se inyectan 0,5 mL de vacuna por vía subcutánea a pollas de tres semanas en adelante y se repite la vacunación antes de la puesta.

El intervalo mínimo entre las vacunaciones debe ser de 6 semanas.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Consejos para una correcta administración

Agítela bien antes del uso

Utilice jeringas y agujas estériles

Evite la posibilidad de contaminación

Vacune solo animales sanos en la parte inferior del cuello



Una vez reconstituida, utilícela antes de 3 horas

Efectos Secundarios

Las pollas pueden mostrarse menos activas en las cinco horas siguientes a la vacunación, pero todas ellas regresan a la normalidad al día siguiente.

Durante la semana siguiente a la vacunación, la mayoría de los animales muestran en el punto de inyección una pequeña hinchazón pasajera que desaparece gradualmente.

2

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición de frascos y todo contenido sobrante debe realizarse acorde con la legislación local.

Para el usuario:

Este producto contiene aceite mineral. La inyección accidental / autoinyección puede causar dolor intenso e hinchazón, sobre todo si se inyecta en una articulación o un dedo, y podría resultar en la pérdida del dedo afectado si la atención médica inmediata no se da. En caso de inyectarse accidentalmente con este producto, busque consejo médico, incluso si sólo una cantidad muy pequeña es inyectada, y lleve el prospecto con usted. Si el dolor persiste durante más de 12 horas después del examen médico, acuda al médico de nuevo.

Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. Incluso si pequeñas cantidades se han inyectado, la inyección accidental de este producto puede causar inflamación intensa, que puede resultar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Se requiere una RÁPIDA atención quirúrgica, practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente donde hay participación de los tejidos blandos del dedo o el tendón.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C y 8°C

Proteger de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 500 mL (1000 dosis)

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia