



FICHA TÉCNICA

NOBILIS® ND C2

Registro ICA No. 9398-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna **liofilizada** contra la Enfermedad de Newcastle en pollos

COMPOSICIÓN

Cada dosis de vacuna contiene:

Virus vivo atenuado de la Enfermedad de Newcastle, cepa C2	≥ 5,7 Log ₁₀ DIE ₅₀
Excipientes c.s.p.	1 dosis

INDICACIONES

Para la inmunización de pollos a fin de reducir los signos clínicos y la mortalidad causadas por el virus de la Enfermedad de Newcastle.

ESPECIE DESTINO

Aves

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado

DOSIS, VÍA y MODO DE ADMINISTRACIÓN

La vacuna se puede administrar por instilación ocular o nasal o por pulverización a pollos de 1 día de edad en adelante, mediante aplicación ocular/nasal o por nebulizador.

Administrar 1 dosis de al menos 5,7 Log₁₀ DIE₅₀ por animal.

Una vez abierto el envase utilizar el total del contenido.

Aplicación ocular/nasal:

Reconstituir la vacuna con el Nobilis® Diluent O/N para 1000 dosis o 2500 dosis, según corresponda a la presentación comercial de la vacuna. Utilizando el frasco del Diluent O/N aplique directamente una gota en la fosa nasal o el ojo del ave.

Garantizar que la gota nasal sea inhalada antes de liberar el ave.

Nebulizador:

Reconstituir la vacuna en agua limpia y fresca a la cual se le puede agregar leche descremada al 2%. El volumen de agua para reconstitución debe ser suficiente para garantizar una distribución equitativa cuando se nebuliza a las aves. Esto variará de acuerdo con la edad de las aves que están siendo vacunadas y el sistema de tratamiento, pero se sugieren 200 a 500 mL de agua por 1000 dosis.



La suspensión de la vacuna debe ser nebulizada de forma homogénea sobre las aves a una distancia de 30-40 cm, preferiblemente cuando las aves están reposando juntas bajo luz tenue. El nebulizador debe estar libre de sedimentos, corrosión y rastros de desinfectantes y ser utilizado únicamente para fines de vacunación.

2

Programa de vacunación

Debido a la naturaleza suave de la cepa C2 de la Vacuna, ésta es adecuada para la vacunación desde el primer día de vida en adelante y se recomienda revacunar después de 2 o 3 semanas con una vacuna lentogénica NDV a virus vivo para aumentar la inmunidad.

El momento óptimo y el método de administración depende en gran medida de la situación local. Se debe pedir consejo a un médico veterinario.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Lave y desinfecte sus manos y el equipo después de vacunar. Toda la vacuna y el material sobrante debe disponerse acorde con la legislación local.

Evite, tanto como sea posible, la exposición al virus de la vacuna.

Vacune solo a los animales sanos.

Cada vial debe utilizarse inmediatamente después de abierto.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición de frascos y todo contenido sobrante debe realizarse acorde con la legislación local.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C y 8°C

Proteger de la luz. No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 500 dosis, 1000 dosis, 2500 dosis, 5000 dosis, 10000 dosis y 25000 dosis. Caja por 10 frascos. Es posible que no todos los tamaños de envase se encuentren disponibles comercialmente.

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia