



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® PUPPY DP

Registro ICA No. 4400-DB
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna liofilizada viva contra Moquillo y Parvovirus canina en cachorros a parir de la 6ª semana de edad



COMPOSICIÓN

Cada 1 mL (dosis) contiene:

Virus de Moquillo canino Cepa Onderstepoort	10 ⁵ DICC ⁵⁰
Virus de Parvovirus canino Cepa Clonada 154	10 ⁷ DICC ⁵⁰
Excipientes c.s.p.	1 dosis

INDICACIONES

Para la inmunización activa de cachorros jóvenes contra el Moquillo canino (VMC) y la enfermedad por Parvovirus canino (PVC)

ESPECIE DESTINO

Perros (cachorros jóvenes)

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado para reconstituir

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

El contenido de un vial de vacuna reconstituida deberá inyectarse por vía subcutánea.

Reconstituir inmediatamente antes de usar con la adición del contenido de un vial (1,0mL) de Nobivac® Solvent.

La vacuna deberá utilizarse antes de los 30 minutos posteriores a su reconstitución.

Programa de vacunación:

Nobivac® Puppy DP está indicada para el uso en animales con niveles elevados de anticuerpos maternos (MDA) contra el virus del Moquillo canino/Parvovirus canino. La edad más temprana a la que éstos niveles no interfieren con la vacunación es de 6 semanas en la mayoría de animales.

Para asegurar la protección de cachorros individuales que no responden a esta edad por niveles muy elevados de MDA y proporcionar protección contra Hepatitis (AVC1), infecciones por AVC2 y Parainfluenza, se aconseja revacunar con Nobivac® DHPPi.



Se incluyen las siguientes recomendaciones ya que es probable que la inmunización con Nobivac® Puppy DP forme parte de pautas de vacunación más amplias:

4 - 6 semanas de vida - Nobivac® Puppy DP

8 - 9 semanas de vida - Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto

12 semanas de vida - Nobivac® DHPPi con Nobivac® Lepto, Nobivac® Rabia o Nobivac® RL

2

Revacunación:

Se recomienda que los perros se vacunen contra:

1. Moquillo canino, Hepatitis canina - cada 2 años
2. Parvovirus canino, virus de Parainfluenza canina - cada año
3. Rabia - cada 3 años (puede modificarse para cumplir con los reglamentos locales)

Recomendaciones de uso:

Solo deberán vacunarse perro en buen estado de salud y deberá hacerse una exploración clínica adecuada antes de la inoculación. Después de la vacunación, deberá evitarse el contacto con fuentes potenciales de infección hasta 14 días después de la inoculación.

Deberá utilizarse equipo estéril para la administración y evitar la contaminación de la vacunación con restos de desinfectantes o alcohol.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Ocasionalmente, puede producirse una reacción de hipersensibilidad tipo anafiláctica leve después de la vacunación, igual que puede suceder con todas las proteínas extrañas. Estas reacciones son autolimitadas en la mayoría de los casos.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Almacenar refrigerada entre 2°C - 8°C.

Proteger de la luz.

Deberá evitarse la exposición prolongada o repetida a temperaturas ambientales elevadas una vez sacada de la nevera antes de usar; la potencia de la vacuna puede reducirse enormemente en el transcurso de algunas horas y en condiciones de mucho calor.

Nobivac® Solvent puede conservarse a temperatura ambiente.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Estuche que contiene 10 frascos por 1 dosis cada uno

FABRICADO POR

Intervet International B.V.
Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

3