



FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® TRICAT TRIO

Registro ICA No.8573-BV

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada dosis contiene:

Virus de la Rinotraqueítis felina, Cepa G2620A	$\geq 5.2 \log_{10}$ UFP
Virus de la Panleucopenia felina, Cepa MW-1	$\geq 4.3 \log_{10}$ DICT ₅₀
Calicivirus felino, Cepa F9	$\geq 4.6 \log_{10}$ UFC
Excipientes c.s.p.	1 mL



INDICACIONES

Inmunización activa de gatos a partir de 8ª - 9ª semanas de edad a fin de reducir los signos clínicos y la excreción de virus causados por la infección con el Calicivirus felino (FCV) y el virus de la Rinotraqueítis felina (FVR), y para prevenir los signos clínicos, la excreción del virus y leucopenia causados por el virus de la Panleucopenia felina (FPLV).

La duración de la inmunidad es de 1 año para los componentes FCV y FVR y de 3 años para el componente FPLV.

ESPECIE DESTINO

Gatos

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado para reconstituir

DOSIS, VÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Reconstituir la vacuna con el diluyente acompañante inmediatamente antes del uso.

Inyectar en el vial de la vacuna y agitar con cuidado hasta que la pastilla de vacuna se haya disuelto completamente.

Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente y a continuación administrar 1 mL de vacuna por la vía subcutánea.

Utilizar equipo de inyección limpio, pero evitar el contacto de la vacuna con desinfectantes.

Esquema de vacunación

Para el esquema de vacunación inicial, es necesario que se inyecten 2 dosis subcutáneamente, con intervalo de 3-4 semanas.

La primera inoculación se administra a la edad de 8-9 semanas, y la segunda inoculación se administra a la edad de 12 semanas.



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Ya que el producto no ha sido probado en gatas gestantes ni durante la lactancia, no se recomienda la vacunación durante la gestación.

Vacunar únicamente animales sanos

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 2°C - 8°C.

Proteger de la luz.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco unidosis (1 mL) acompañado de frasco por 1 mL de diluyente.

Estuche por 5 o 25 frascos

FABRICADO POR

Intervet International B.V.

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia

2