

FICHA TÉCNICA

NUFLOR®

Registro ICA No. 4066-DB
USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Florfenicol	300 mg
Excipientes c. s. p	1 mL

INDICACIONES

En **bovinos** para el tratamiento de enfermedades ocasionadas por *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Fusobacterium sp.*, *Clostridium sp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella sp.*, *Shigella sp.*, *Treponema sp.*, *Corynebacterium sp.*

En **porcinos**, para el tratamiento de enfermedades respiratorias asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinis*, *Salmonella cholerae-suis* y *Streptococcus suis* tipo II.

ESPECIES DESTINO

Bovinos y Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Bovinos:

La dosis recomendada de Nuflor® solución inyectable es de 20 mg/kg/peso vivo (1 mL/15 kg) por vía intramuscular, preferentemente en la musculatura del cuello.

No administrar más de 20 mL en el mismo sitio. Se debe administrar un total de dos dosis con 48 horas de intervalo.

Alternativamente puede administrarse vía subcutánea en una sola dosis de 40 mg/kg/peso vivo, que produce niveles sanguíneos eficaces en bovinos (>0.5 µg/ml) por 84-156 horas post administración, para un efecto de larga acción.

Porcinos:

15 mg/kg de peso corporal (1 mL/20 kg de peso), administrado en 2 dosis por vía intramuscular con intervalo de 48 horas.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Una vez abierto el frasco su contenido se debe consumir dentro de los 28 días siguientes; descarte el líquido sobrante.



TIEMPO DE RETIRO

Bovinos:

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 36 días después de finalizado el tratamiento.

Se puede usar en cualquier etapa reproductiva, a excepción de bovinos en producción de leche destinada al consumo humano.

2

Porcinos:

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura inferior a 25°C

ADVERTENCIAS

Reacciones adversas:

Pueden presentarse inapetencia transitoria durante el tratamiento.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos por 50mL, 100mL y 250 mL

FABRICADO POR

Trirx Segre

Francia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia