

FICHA TÉCNICA

ORASTINVEST®

Registro ICA No. 162-DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución inyectable contiene:

Oxitocina sintética	10 U.I.
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES

Oxitócico para provocar contracción del miometrio y el descenso de la leche.

ESPECIE DESTINO

Yeguas, vacas, cerdas, cabras, gatas y perras.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Especie	Intramuscular o Subcutánea	Intravenosa
Yegua - Vaca	20 - 60 UI (2-6 mL)	15-40 UI (1.5-4 mL)
Cerdas hasta 25 kg	10 - 20 UI (1-2 mL)	10 UI (1 mL)
Cerdas ≥ 250 kg	30 UI (3 mL)	10-20 UI (1-2mL)
Perra - Gata	3 - 15 UI (0.3-1.5 mL)	2-10 UI (0.2-1 mL)
Oveja - Cabra	3 - 15 UI (0.3-1.5 mL)	2-10 UI (0.2-1 mL)

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Cuando se use para favorecer el parto, se debe estar seguro de que hay buena dilatación del cuello uterino y que el feto se encuentra en buena presentación y posición.

Para eliminar placenta, sólo se debe usar en los primeros siete días después del parto.

Después de tomar la primera dosis, utilizar el producto dentro de los 28 días siguientes.

No usar en animales que presenten hipersensibilidad a la sustancia activa y/o alguno de los excipientes.

No usar en caso de distocia por presentación anormal, desproporción pélvico-fetal o cualquier tipo de obstrucción mecánica.



ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2 °C - 8 °C.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos por 5mL, 10mL, 25mL y 50 mL,

FABRICADO POR

Intervet International GmbH

Alemania

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia

2