



FICHA TÉCNICA

OXITRAT® L.A. PLUS

Registro ICA No. 10531-MV

USO VETERINARIO



COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución contiene:

Oxitetraciclina base (como clorhidrato)	20 g
Diclofenaco sódico	1 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

INDICACIONES

En bovinos de carne para el tratamiento de infecciones ocasionadas por bacterias sensibles a la oxitetraciclina tales como *Bordetella bronchiseptica*, *Fusobacterium necrophorum*, *Streptococcus uberis*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* y *Anaplasma marginale*, y únicamente cuando el animal manifieste signos clínicos asociados a la inflamación, como fiebre y dolor.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

La dosificación recomendada es de 1,0 ml/10 kg de peso corporal, que corresponde a 20 mg de oxitetraciclina/kg de peso y 1,0 mg de diclofenaco sódico/Kg de peso para bovinos.

Intervalo entre las dosificaciones:

Normalmente, una dosis es suficiente para un tratamiento efectivo; pero en infecciones graves, una segunda dosis debe administrarse 3 días tras la primera aplicación.

Volumen máximo recomendado por punto de aplicación: 10 mL.

Las dosis superiores a las indicadas, administradas por vía intramuscular, se deben subdividir en dos o más puntos de aplicación.

Las subdosificaciones pueden facilitar el desarrollo de la resistencia e interferir en la eficacia del tratamiento.



2

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Un posible oscurecimiento de la solución puede ocurrir, y esto no implica la pérdida de la calidad terapéutica del producto.

No se debe administrar a animales con historial de hipersensibilidad a las tetraciclinas y/o que tengan alteraciones hepáticas o renales.

Tras la apertura del frasco, el producto debe consumirse en un máximo de 10 días y deben descartarse las eventuales sobras.

Se debe asegurar que se realice fluidoterapia de soporte durante el tratamiento para garantizar la correcta distribución del fármaco.

No se indica para uso en équidos, perros y gatos

Aunque el antibiótico sea bien tolerado, se pueden observar pequeñas reacciones locales (leve edema) de naturaleza transitoria.

No administrar con antimicrobianos bactericidas.

No administrar a hembras gestantes.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 39 días después de finalizado el tratamiento.

No administrar en vacas cuya leche se destina al consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Conservar entre 15 °C y 30 °C

No exponer a la luz.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos por 50mL y 100mL

FABRICADO POR

VALLÉE S.A.

Brasil

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia