

FICHA TÉCNICA

PG 600®

Registro ICA No. 3862-DB

USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de producto reconstituido contiene:

Gonadotropina sérica (PMSG)	80 U.I
Gonadotropina coriónica (HCG)	40 U.I
Excipientes c.s.p	1 mL

INDICACIONES

En hembras porcinas para la inducción y la sincronización del estro.

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado para reconstituir

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Reconstituir la solución inyectable e inyectar el contenido del vial de una dosis (5 mL), o una dosis (5 mL) del vial de 5 dosis.

Preparación de la solución para 5 dosis:

Con una jeringuilla, inyectar una pequeña cantidad del diluyente en el vial que contiene el liofilizado. Agitar hasta que el liofilizado se disuelva completamente.

Reintroducir esta solución en el vial de diluyente y mezclarlo bien.

	Indicación	Momento de aplicación
Cerdas adultas	Inducción del celo	0-2 días después del destete
	Aumentando del tamaño de la camada en subfertilidad	0-2 días después del destete
	Anestro	Aproximadamente 10 días después del destete
	Diagnóstico de gestación	Dentro de los 80 días posteriores a la cubrición o inseminación artificial



	Indicación	Momento de aplicación
Cerdas nulíparas	Anestro	A los 8-10 meses de edad
	Inducción del celo en cerdas prepúberes	A los 5.5-6,5 meses de edad y /o los 85-100 Kg de peso (las cerdas pueden ser inseminadas en el primer celo tras el tratamiento. Si la inseminación se retrasa hasta el segundo celo después del tratamiento pueden esperarse camadas más numerosas).
	Diagnóstico de gestación	Dentro de los 80 días posteriores a la cubrición o inseminación artificial.
Nota	Sincronización de celos: El uso de PG 600 para todas las indicaciones antes mencionadas provocada el celo de 3 a 6 días después del tratamiento.	

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Raramente pueden aparecer reacciones anafilácticas: si aparecen los síntomas pueden administrarse glucocorticoides o adrenalina (1:1000) por vía IV o IM.

Si usted observa algún efecto secundario, por favor, comuníquese a su veterinario.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2 °C - 8 ° C.

Una vez reconstituido puede conservarse hasta 24 horas almacenado entre 2°C - 8°C.

ADVERTENCIAS

En caso de reacción anafiláctica administrar 2-3 mL de adrenalina 1: 1000.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 1 dosis y 5 dosis acompañados por 5 mL y 25 mL de diluyente respectivamente

FABRICADO POR

Intervet International B.V.
Holanda

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia