

## FICHA TÉCNICA

### PORCILIS® APP

Registro ICA No. 5527-DB  
USO VETERINARIO

1

#### DESCRIPCIÓN

Vacuna de *Actinobacillus pleuropneumoniae*. La vacuna se basa en una proteína de la membrana externa (PME) y tres toxoides (Apx I, Apx II y Apx III destoxificados), producidos por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae*.



#### COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2mL con 600 mg de antígenos contiene:

Concentrado de antígeno de Apx I (Toxoide de hemolisina tipo I)	50 und
Concentrado de antígeno de Apx II (Toxoide de hemolisina tipo II)	25-78 und
Concentrado de antígeno de Apx III (Toxoide de toxina macrófago)	50 und
Concentrado de antígeno de OMP (Proteína de membrana)	50 und
Excipientes c.s.p.	1 dosis
Adyuvante acuoso	
Conservante: Formaldehído	

#### INDICACIONES

Inmunización activa de cerdos de levante contra la neumonía causada por el *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

#### ESPECIE DESTINO

Porcinos

#### FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión acuosa

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Permitir que la vacuna alcance la temperatura ambiente (15°C - 25°C) antes de utilizarla.  
2 mL vía intramuscular profunda en la región posterior de la oreja  
Agitar la vacuna antes de utilizarla y durante su uso

#### Programa de vacunación:

La vacunación se hace desde las 6 semanas de edad.

Se deben hacer dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas.

Se recomienda:

1<sup>ra</sup> vacunación: 6 semanas

2<sup>da</sup> vacunación: 10 semanas



## **PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES**

Vacunar únicamente animales sanos

No mezclar con otras vacunas u otras sustancias

Utilizar jeringa y aguja estériles

Si no se ha utilizado a las 10 horas, los frascos abiertos deberán descartarse

2

### **Reacciones a la vacuna:**

Tras la vacuna, los cerdos presentan una reacción sistémica ligera con fiebre, decaimiento y anorexia. Si tuvieran el estómago lleno en el momento de la vacunación, a veces pueden darse vómitos. En cierto número de cerdos, pueden presentarse inflamaciones ligeras transitorias en el lugar de la inyección. Estas reacciones desaparecen pasadas las 24 horas después de la vacunación.

## **TIEMPO DE RETIRO**

Cero días

## **ALMACENAMIENTO**

Conservar entre 2 °C a 8 °C, protegida de la luz evitando que se congele.

## **ADVERTENCIAS**

Disponer de frascos vacíos y contenido sobrante acorde con la legislación local

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

## **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 10 dosis, 25 dosis, 50 dosis y 125 dosis.

### **FABRICADO POR**

Intervet International B.V.

Países Bajos

### **IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia