



FICHA TÉCNICA

PORCILIS® PCV M Hyo

Registro ICA No. 10161-BV

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de emulsión inyectable contiene:

Antígeno subunitario ORF 2 del Circovirus Porcino Tipo 2	≥ 1.414 AU ¹
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> inactivado	≥ 2.69 RPU ²
Excipientes c.s.p.	1 mL

¹ UA: Unidades Antigénicas

² RPU: Unidades de Potencia Relativa

INDICACIONES

Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la carga viral en órganos y tejidos linfoides, la eliminación del virus, provocado por infecciones de Circovirus Porcino Tipo 2 (PCV2) y la severidad de las lesiones pulmonares ocasionadas por infección con *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Asimismo, para disminuir la pérdida diaria de peso asociada con el PCV2 y/o la infección con *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Inicio de la inmunidad con vacunación de 1 sola dosis:

PCV2: 2 semanas

M. hyopneumoniae: 4 semanas

Inicio de la inmunidad con vacunación multidosis:

PCV2: 18 días después de la primera vacunación

M. hyopneumoniae: 3 semanas después de la primera vacunación

Duración de la inmunidad (con ambos esquemas):

PCV2: 22 semanas después de la última vacunación

M. hyopneumoniae: 21 semanas después de la última vacunación

ESPECIE DESTINO

Porcinos.

FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vacunar a los cerdos por vía intramuscular.

Esquema de una sola dosis:

Una sola dosis de 2 mL en cerdos a partir de las 3 semanas de edad.

Esquema de dosis repetidas:

Una dosis repetida de 1 mL en cerdos comenzando a los 3 días de edad con un intervalo de al menos 18 días.

Cuando ocurren infecciones por cualquiera de los agentes en forma temprana, se recomienda el esquema de dosis repetidas.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Antes de aplicar la vacuna permita que alcance la temperatura ambiente y agite bien el frasco antes de utilizar.

Evite la introducción de contaminantes.

Reacciones Adversas

En estudios de laboratorio y ensayos de campo: Puede ocurrir un aumento transitorio de la temperatura corporal de aproximadamente 1°C el día de la vacunación. Los animales se recuperan al día siguiente. En casos particulares se pueden observar reacciones sistémicas leves hasta un día después de la vacunación. En muy pocos casos se pueden observar una reacción de hipersensibilidad después de la primera vacunación en el esquema multidosis. Algunos animales pueden mostrar reacciones temporales locales en la zona de la vacunación.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

Se dispone de datos de seguridad y eficacia que demuestran que esta vacuna puede ser administrada simultáneamente y en sitios separados con Porcilis® PRRS a partir de las 3 semanas de edad. La literatura de Porcilis® PRRS deberá ser consultada.

En cerdos individuales, el incremento en la temperatura después del tratamiento puede comúnmente exceder los 2°C. La temperatura vuelve a la normalidad 1 a 2 días después de que el pico de temperatura es observado. Reacciones locales transitorias en el sitio de la inyección, las cuales se limitan a inflamación leve (máximo 2cm de diámetro), pueden ocurrir comúnmente justo después de la vacunación, pero en algunas ocasiones pueden no aparecer hasta 12 días después de la vacunación. Todas estas reacciones desaparecen en el transcurso de 6 días. En raras ocasiones pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad después de la vacunación.

No hay información disponible respecto a la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando es usada con algún otro producto medicinal veterinario, excepto el mencionado anteriormente. La decisión de usar esta vacuna antes o después de algún otro producto médico veterinario se debe tomar caso a caso.

No mezclar con ningún otro medicamento de uso veterinario.



Precauciones especiales que debe tomar la persona que administra el producto médico veterinario:

Para el usuario:

Este producto contiene aceite mineral. La administración accidental/autoadministración de este producto puede provocar dolor severo e inflamación, especialmente si se administra en una coyuntura o dedo; en raras ocasiones puede ocasionar la pérdida del dedo afectado si no se presta atención médica inmediata. Si usted se administra accidentalmente este producto, aunque se trate sólo de una cantidad muy pequeña, consulte inmediatamente a un médico y muéstrele el prospecto del empaque. Si el dolor persiste durante más de 12 horas después del examen médico, consulte nuevamente a su doctor.

Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. La administración accidental de este producto, aunque sea con una cantidad pequeña, puede provocar inflamación intensa y derivar, por ejemplo, en necrosis isquémicas e incluso la pérdida del dedo. Se requiere atención quirúrgica INMEDIATA de un especialista y quizá sea necesario realizar una incisión e irrigación urgente del área afectada, especialmente si se trata de la yema o el tendón del dedo.

TIEMPO DE RETIRO

Cero días.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Almacénese entre 2°C - 8°C.

No congelar. Protéjase de la luz directa del sol.

Una vez abierta, la vacuna debe aplicarse dentro de las siguientes 8 horas.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 20 mL (10 dosis), 50mL (25 dosis), 100mL (50 dosis), 200mL (100 dosis) y 500 mL (250 dosis)

FABRICADO POR

Intervet International B.V

Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia