

FICHA TÉCNICA

PROCYON® HCPCh+ FeLV

Registro ICA No. 9045-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Consta de una fracción liofilizada (Procyon®HCPCh) que contiene antígenos vivos atenuados del virus de la Rinotraqueítis Felina, el Calicivirus felinos, el virus de la Panleucopenia felina y *Chlamydia psittaci*, y de una fracción líquida (Procyon® FeLV) que contiene el virus de la Leucemia Felina inactivado químicamente y combinado con un adyuvante para potenciar la respuesta inmune. Contiene trazas de gentamicina y anfotericina B, remanentes del proceso de producción.

La fracción líquida se utiliza como diluyente de la fracción liofilizada.



COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1 mL contiene:

Fracción liofilizada

Virus de la Rinotraqueítis Felina (FVR) cepa 593-J	$\geq 10^{4.7}$ UFP
Calicivirus Felino (FCV) cepa 894-T	$\geq 10^{3.1}$ UFP
Virus de la Panleucopenia Felina (FPL), cepa Philips Roxane	$\geq 10^{3.0}$ TCID ₅₀
<i>Chlamydia psittaci</i> , cepa Baker	$\geq 10^{2.5}$ YSLD ₅₀

Fracción líquida

Virus de la leucemia felina, aislamiento Rickard	≥ 1 RP
Excipientes c.s.p.	1 dosis

INDICACIONES

Inmunización activa de gatos sanos como ayuda en la prevención de las enfermedades producidas por el virus de la Rinotraqueítis Felina, el Calicivirus felino, el virus de la Panleucopenia felina y *Chlamydia psittaci*, y como ayuda en la prevención de los tumores linfocitos y las enfermedades asociadas con la infección por el virus de la Leucemia Felina.

La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos a virus de la Leucemia Felina virulentos.

ESPECIE DESTINO

Gatos

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado y solución inyectable



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Previo a su uso, permitir que la fracción líquida alcance la temperatura ambiente y agitar bien. Transferir el contenido del vial de Procyon[®] FeLV en forma aséptica al vial de Procyon[®] HCPCh. Mezclar suavemente hasta la completa reconstitución.

El contenido del vial de vacuna reconstituida (1 mL) debe administrarse por vía subcutánea o intramuscular inmediatamente después de la reconstitución.

2

Programa de vacunación:

Para la vacunación inicial se requieren dos dosis. La primera, a las 9 semanas de edad o más. La segunda 3-4 semanas después de la primera dosis.

Revacunar cada 2 años con una dosis de Procyon[®] HCPCh+FeLV.
En los años intermedios vacunar con una dosis de Procyon[®] HCPCh.

PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

No vacunar hembras gestantes
No mezclar con otras vacunas

El uso de cualquier producto biológico puede producir una reacción anafiláctica.

Antídoto: epinefrina, corticosteroides y antihistamínicos pueden ser indicados dependiendo de la naturaleza y severidad de la reacción.

Algunos reportes sugieren que la administración de ciertos productos biológicos en gatos puede inducir el desarrollo de fibrosarcomas en el sitio de inyección.

Consulte al Médico Veterinario
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Es importante tener en cuenta que ciertas condiciones y eventos pueden hacer que algunos gatos sean incapaces de desarrollar o mantener una respuesta inmune adecuada luego de la vacunación contra la Leucemia Felina. La exposición previa a la enfermedad o la vacunación durante la latencia de la enfermedad son condiciones en las que la vacunación puede no alterar el curso de la enfermedad. Por lo tanto, se recomienda la evaluación diagnóstica de todos los gatos en busca de Leucemia Felina previo a la vacunación.

La vacunación con este producto no brinda protección contra el virus de la Inmunodeficiencia Felina, otro retrovirus felino. Es importante informar a los dueños de gatos sobre estas situaciones previo a la vacunación.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C a 7°C.
No congelar.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Estuche de 25 frascos de vacuna por 1 dosis.

FABRICADO POR

Intervet Inc.
Estados Unidos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

3