



FICHA TÉCNICA

REGUMATE® PORCINO

Registro ICA No. 8155-MV
USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución oleosa contiene:

Altrenogest	4 mg
Excipientes c.s.p.	1 mL

INDICACIONES

En cerdas sexualmente maduras para la sincronización del estro.

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución oleosa

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral en el alimento.

Sincronización del estro en cerdas nulíparas que estén ciclando:

Administrar: 20mg/animal/día.

En la práctica 5 ml por animal diariamente durante 18 días consecutivos.

El estro se presentará de 3 a 5 días después de suspender el tratamiento.

En cerdas multíparas el tratamiento debe iniciarse al momento del destete:

Administrar: 20mg/animal/día.

En la práctica 5 ml a cada cerda diariamente durante 3 días.

El estro se presentará de 2 a 3 días después de suspender el tratamiento.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No debe ser administrado por mujeres embarazadas.

Utilizar guantes y ropa de protección. Lavar las manos después de su uso. Protéjase del calor.

Los residuos de alimento medicado deben ser eliminados y no permitir que otro animal los consuma.

No administrar a machos

No administrar a cerdas gestantes o con infecciones uterinas.



TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 9 días después de finalizado el tratamiento.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo formula del médico veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Almacenar por debajo de 30°C

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envase por 360 mL, 540 mL y 1000 mL acompañado de una copa dosificadora.

FABRICADO POR

Intervet Productions S.A.
Francia

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

2