

## FICHA TÉCNICA

### SOFOMAX®

Registro ICA No. 6123-MV

USO VETERINARIO



1

### COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de suspensión oral contiene:

Triclabendazol	10 g
Abamectina	0,2 g

### INDICACIONES

Para el control en bovinos y ovinos de los nematodos gastrointestinales: *Toxocara sp.*, *Haemonchus sp.*, *Ostertagia sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Cooperia sp.*, *Nematodirus sp.*, *Strongyloides sp.*, *Bunostomum sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Trichuris sp.*, *Dictyocaulus sp.* y *Fasciola hepatica*.

Bovinos y ovinos

### FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración vía oral

**Bovinos:** 10 ml por cada 100 kilos de peso

**Ovinos:** 1 ml por cada 10 kilos de peso

### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No administrar en terneros menores de 4 meses de edad.

No administrar a vacas en producción de leche para el consumo humano.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura inferior a 30°C

### ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos



### **TIEMPO DE RETIRO**

Los bovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.

Los ovinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 21 días después de finalizado el tratamiento.

2

### **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Frasco por 20 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L, 2 L y 2.5 L

### **FABRICADO POR**

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda  
Brasil

### **IMPORTADO POR**

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.  
Bogotá, Colombia