

FICHA TÉCNICA

STIMOVIT® CALCIO

Registro ICA No.10473-MV

USO VETERINARIO

1

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contienen:

Gluconato de calcio monohidratado (aporte de Ca ⁺ 101,831 mEq)	22,83 g
D-sacarato de calcio tetrahidratado (aporte de Ca ⁺ 0,242 mEq)	0,0387 g
Lactato de calcio pentahidratado (aporte de Ca ⁺ 19,657 mEq)	3,03 g
Hipofosfito de magnesio hexahidratado (aporte de Mg ⁺ 15,245 mEq) (aporte de P 76,23 mEq)	2,00 g
Dextrosa anhidra	5.00 g
Excipientes c.s.p	100 mL



INDICACIONES

Para bovinos, equinos y caprinos que estén presentando sintomatología clínica de deficiencias de calcio, fósforo y magnesio, hipocalcemia posparto (paresia de la parturienta, fiebre vitular o fiebre de la leche), síndrome de la vaca caída y tetania de los pastos (hipomagnesemia).

ESPECIES DESTINO

Bovinos, Equinos y Caprinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución acuosa inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La dosificación indicada para **bovinos, equinos y caprinos** es de 1 mL por kg de peso.

Las vías de administración recomendadas por especie animal son:

Bovinos y Caprinos: Vía endovenosa o subcutánea.

Equinos: Vía endovenosa.

En caso de administración subcutánea, el volumen máximo por sitio de aplicación es de 20 mL para bovinos y 5 mL para caprinos.

Interrumpa la aplicación del producto una vez que se presente reversión del cuadro de hipocalcemia y/o decúbito del animal.



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Animales que sufran de bloqueo atrio-ventricular y otros disturbios cardíacos no deben someterse a terapia con sales de calcio.

Buenas prácticas clínicas minimizan la posibilidad de contaminación del producto.

Use todo el contenido de un frasco una vez abierto. No es recomendado guardar el producto para administración posterior.

No administre en flujo continuo. Administre lentamente cuando sea utilizado por vía endovenosa.

No mezcle STIMOVIT® CALCIO con antibióticos aminoglucósidos, tetraciclinas o sulfato de magnesio debido a incompatibilidad.

No utilice STIMOVIT® CALCIO en animales con problemas cardiacos o con insuficiencia renal grave.

Solamente utilice STIMOVIT® CALCIO de apariencia límpida, incolora o levemente amarillenta.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 15°C y 30°C. No exponerlo a la luz.

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 250 y 500 mL

FABRICADO POR

Vallée S.A.

Brasil

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia