



FICHA TÉCNICA

TICK GARD®

Registro ICA No. 10654-MV
USO VETERINARIO



1

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución tópica contienen:

Fluazuron	2,5 g
Fipronil	1,25 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

INDICACIONES

En bovinos, en el tratamiento y control de las infestaciones por *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* (garrapata de los bovinos), en la prevención y como ayuda en el control de larvas de *Cochliomyia hominivorax* (gusaneras), en el tratamiento y prevención de las larvas de *Dermatobia hominis* (nuche) y en el tratamiento y prevención de *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos).

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrarse a la dosis única de 1 mL de producto por cada 10 Kg de peso vivo, correspondiente a 2,5 mg/Kg de Fluazuron y 1,25 mg/Kg de Fipronil.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación. Lavar las manos con agua y jabón después del manejo del producto. Utilizar equipo adecuado de protección: botas, delantal, máscara y anteojos. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Si se produce una exposición accidental en la piel, lavar la zona afectada con agua corriente y jabón. Si se produce una exposición accidental a los ojos, lavarlos inmediatamente con agua limpia. En caso de ingestión accidental, lavar la boca con abundante agua. No inducir el vómito y buscar atención médica inmediatamente. En caso de síntomas de intoxicación debido a la exposición, buscar orientación médica inmediatamente presentando el prospecto del producto.

Precauciones para la fauna:

No arrojar producto a fuentes de agua. Producto tóxico en peces. Extremadamente tóxico para aves. Extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No contamine fuentes de agua. Altamente tóxico para abejas. Puede matar abejas y polinizadores.



Instrucciones de primeros auxilios:

En caso de intoxicación, llame al Médico inmediatamente o lleve el paciente al Médico y muéstrelle una copia de esta etiqueta. No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático. En caso de intoxicación del animal llamar al Médico Veterinario.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación.

2

Disponga del envase de acuerdo con los programas de recolección postconsumo según disposiciones ambientales vigentes

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 148 días después de finalizado el tratamiento.

No debe utilizarse en animales en producción de leche para consumo humano.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.

Mantenga el envase bien tapado.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 1 L y 5 L

FABRICADO POR

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.
Brasil

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia