

FICHA TÉCNICA

TRIATOX[®]

Registro ICA No. 1111-DB
USO VETERINARIO



COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contienen:

Amitraz técnico	12.5 g
Excipientes c.s.p	100 mL

INDICACIONES

En bovinos para el control de garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma cajennense*.

ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Concentrado Emulsionable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Mezclar 1 litro de TRIATOX[®] por cada 600 litros de agua. La dilución debe prepararse inmediatamente antes de usarse. Generalmente cuando se utilizan bombas de mano, un animal requiere entre 4 y 5 litros de dilución.

Tratamiento rutinario contra garrapatas:

En caso de *Rhipicephalus microplus* (garrapata de un solo huésped) bañar cada 21 días. En infestaciones graves bañar cada 10 días, hasta obtener un buen control. Después continuar bañando cada 21 días. En caso de *Amblyomma cajennense* (garrapata de tres huéspedes) bañar cada 7 días.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Usar guantes de caucho y máscara al mezclar el producto. No fumar ni comer durante la aplicación. En caso de contacto accidental con piel y ojos, lavar abundantemente con agua y jabón. Báñese y cámbiese de ropa una vez finalizado el trabajo.

Precauciones para la fauna:

No arrojar producto a fuentes de agua. Producto tóxico en peces. Altamente tóxico para abejas.

Instrucciones de primeros auxilios:

En caso de intoxicación, llame al Médico inmediatamente o lleve el paciente al Médico y muéstrela una copia de esta etiqueta. No hay antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático. En caso de intoxicación del animal llamar al Médico Veterinario.



Disponga del envase de acuerdo con los programas de recolección postconsumo según disposiciones ambientales vigentes

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños, animales domésticos y alimentos

2

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el envase bien tapado.

Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envase por 33, 100, 235, 470 y 100 mL

FABRICADO POR:

Schering-Plough Animal Health
Estados Unidos

IMPORTADO POR:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia