



FICHA TÉCNICA

BOVILIS® VISTA L5 SQ

Registro ICA No. 9208-BV
USO VETERINARIO

1

DESCRIPCIÓN

Vacuna contra la Rinotraqueítis Bovina, virus de la Diarrea Viral Bovina, virus de la Parainfluenza 3 y virus de la Enfermedad Respiratoria Sincitial Bovina. Virus vivos modificados.



COMPOSICIÓN

Virus Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR)	$\geq 10^{3.6}$ TCID ₅₀
Virus Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 1	$\geq 10^{3.8}$ TCID ₅₀
Virus Diarrea Viral Bovina (DVB) Tipo 2	$\geq 10^{3.5}$ TCID ₅₀
Virus Parainfluenza (PI3) Tipo 3	$\geq 10^{5.1}$ TCID ₅₀
Virus Respiratorio Sincitial Bovino (BRSV)	$\geq 10^{3.8}$ TCID ₅₀
<i>Leptospira interrogans</i> Serovar <i>canicola</i>	al menos 1.2 RP*
<i>Leptospira interrogans</i> Serovar <i>grippotyphosa</i>	al menos 1.2 RP*
<i>Leptospira interrogans</i> Serovar <i>hardjo</i>	al menos 1.1 RP*
<i>Leptospira interrogans</i> Serovar <i>icterohaemorrhagiae</i>	al menos 1.3 RP*
<i>Leptospira interrogans</i> Serovar <i>pomona</i>	al menos 1.0 RP*
Excipientes c.s.p	2 mL

*RP = Potencia relativa

INDICACIONES

Para la vacunación de vacas y vaquillas sanas, de 6 meses de edad o mayores, antes de la monta, como una ayuda en la reducción de abortos debidos a IBR; como una ayuda en la prevención de la infección fetal, incluyendo la presencia de becerros persistentemente infectados a causa del virus de BVD Tipo 1 y como una ayuda en la prevención de becerros persistentemente infectados a causa del virus BVD Tipo 2.

La duración de la inmunidad (DOI) en el aparato reproductor se ha demostrado que es de al menos 217 días para BVD (Tipos 1 y 2). Además, está recomendada para la vacunación de hembras sanas, como ayuda en la prevención de leptospirosis (*L. canicola*, *L. grippotyphosa*, *L. hardjo* - incluyendo la *L. borgpetersenii* serovar *hardjo*, *L. icterohaemorrhagiae* y *L. pomona*) y como una ayuda en la prevención de la dispersión urinaria de organismos *L. hardjo*.

La duración de la inmunidad (DOI) en las vías respiratorias ha demostrado ser por lo menos 182 días para IBR, no menos de 206 días para la BVD Tipo 1 y al menos 200 días para la BVD Tipo 2.

Se puede utilizar en novillas y vacas preñadas, o vacas preñadas en lactancia. Las vacas y novillas para vacunar deben haber sido vacunadas antes de la reproducción, dentro de los 12 meses anteriores, con alguna de las vacunas vivas modificadas de IBR o BVD de esta línea de productos.



ESPECIE DESTINO

Bovinos

FORMA FARMACÉUTICA

Liofilizado

2

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyectar 2 mL por vía subcutánea 14-60 días antes de la monta en bovinos sanos de 6 meses de edad o mayores.

Se recomienda la revacunación anual.

Para la revacunación se puede administrar una dosis a intervalos más frecuentes basados en la evaluación de riesgo u otras condiciones de epidemia que existen o son reportadas en cada explotación.

PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Utilizar inmediatamente después de reconstituida; no guardar remanentes de la vacuna.

Utilizar solo en bovinos sanos.

Rehidratar el vial de la vacuna liofilizada Bovilis® Vista 5 SQ con el vial que lo acompaña de Bovilis® Vista L5 SQ.

Mezclar bien el vial reconstituido.

TIEMPO DE RETIRO

No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en refrigeración a 2°C-8°C

ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Los recipientes y el producto sobrante deben ser dispuestos acorde con la legislación local.

Riesgos en la salud letal asociados con la vacunación de animales preñados con vacunas vivas modificadas no pueden ser determinados en forma absoluta por los estudios clínicos realizados para obtener el registro.

Las estrategias de manejo basadas en la vacunación de animales preñados con vacunas vivas modificadas deben ser discutidas con el veterinario.

Si se presentan reacciones alérgicas, administre epinefrina.

Contiene penicilina, estreptomicina y timerosal como conservantes.



PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frascos por 5 dosis, 10 dosis, 50 dosis y 100 dosis.

FABRICADO POR:

Intervet Inc.
Estados Unidos

IMPORTADO POR:

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia

3