



## FICHA TÉCNICA

### PORCILIS® M Hyo ID Once

Registro ICA No. 8801-BV

USO VETERINARIO

1

#### COMPOSICIÓN

Cada dosis de 0,2 mL de bacteria contiene:

*Mycoplasma hyopneumoniae*, cepa 11

$\geq 6,5 \log_2$  TA\*

Excipientes c.s.p

0,2 mL

\*TA: Título de Anticuerpos

Adyuvante: contiene dl- $\alpha$ -tocoferol

#### INDICACIONES

Para la inmunización activa de cerdos de engorde para reducir las lesiones pulmonares debidas a la infección por *Mycoplasma hyopneumoniae*.

**Inicio de la inmunidad:** 3 semanas después de la vacunación.

**Duración de la inmunidad:** al menos 22 semanas después de la vacunación.

#### ESPECIE DESTINO

Porcinos

#### FORMA FARMACÉUTICA

Emulsión inyectable

#### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración intradérmica de 0,2 mL por animal utilizando un dispositivo intradérmico adecuado.

#### Programa de vacunación

Vacunar una vez a partir de 2 semanas de edad en adelante.

Porcilis® M Hyo ID Once es eficaz en presencia de anticuerpos maternos (AM)

#### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Agitar muy bien antes de usar.

Evitar la introducción de contaminación.

No usar durante la gestación o lactancia.



#### Interacción con otros medicamentos:

Existe información disponible sobre la seguridad y eficacia del producto que demuestra que puede administrarse con Porcilis® PCV ID con una separación de al menos 3 cm durante el mismo día a cerdos de 3 semanas de edad o mayores.

En caso de usar los dos productos el mismo día es común el incremento de 0.2 °C de la temperatura corporal el día de la vacunación. Esta situación se resuelve en uno o dos días después del pico temperatura. La reacción local puede incrementarse hasta casi 6 cm en los individuos y puede durar hasta 7 semanas. Se puede observar enrojecimiento y costras.

2

#### **ADVERTENCIAS**

##### *Al usuario:*

Este producto contiene aceite mineral. Su inyección accidental/auto inyección puede provocar un dolor agudo e inflamación, en particular si se inyecta en una articulación o en un dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo, y en casos excepcionales podría provocar la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica urgente.

En caso de inyectarse accidentalmente con este producto, busque urgentemente consejo médico, incluso si solo se ha inyectado una cantidad muy pequeña, y lleve el prospecto consigo.

Si el dolor persiste más de 12 horas después del examen médico, diríjase de nuevo a un facultativo.

##### *Al médico:*

Este producto contiene aceite mineral. Incluso si se han inyectado pequeñas cantidades, la inyección accidental de este producto puede causar inflamación intensa que podría, por ejemplo, terminar en necrosis isquémica e incluso la pérdida del dedo. Es necesaria atención médica experta INMEDIATA, a cargo de un cirujano dado que pudiera ser necesario practicar inmediatamente una incisión e irrigar la zona de inyección, especialmente si están afectados los tejidos blandos del dedo o el tendón.

No usar durante la gestación o lactancia.

No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.

No se observa reacciones adversas diferentes de las ya mencionadas en el apartado "reacciones adversas" después de la administración de una dosis; sin embargo, estas reacciones pueden ser más pronunciadas.

No mezclar con ningún otro medicamento veterinario.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

#### **ALMACENAMIENTO**

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C)

No congelar. Proteger de la luz directa del sol.

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 3 horas.



### INFORMACIÓN ADICIONAL

Porcilis® M Hyo ID Once es una vacuna bacteriana inactiva que contiene un concentrado de células completas de *Mycoplasma hyopneumoniae* cepa 11.

Este antígeno se incorpora en un adyuvante basado en una combinación de parafina ligera y acetato dl- $\alpha$ -tocoferol para proporcionar una estimulación prolongada de inmunidad.

El producto estimula el desarrollo de inmunidad activa en cerdos contra *Mycoplasma hyopneumoniae*, también en presencia de anticuerpos maternos (AM)

### PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 25 dosis, 50 dosis y 100 dosis.

#### FABRICADO POR

Intervet International B.V  
Países Bajos

#### IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.  
Bogotá, Colombia