

FICHA TÉCNICA

PROCYON® DOG DA2PPvL

Registro ICA No. 6335-BV
USO VETERINARIO



1

DESCRIPCIÓN

Vacuna contra virus de Moquillo, Hepatitis, Parvovirus, Parainfluenza, y Leptospirosis.

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 1mL contiene:

Fración liofilizada

Virus de moquillo canino (CDV)	$\geq 10^{3.7}$ TCID ₅₀
Adenovirus canino Tipo 2 (CAD2)	$\geq 10^{4.8}$ TCID ₅₀
Virus de Parainfluenza canina (CPI)	$\geq 10^{4.3}$ TCID ₅₀
Parvovirus canino (CPV)	$\geq 10^{5.1}$ TCID ₅₀
<i>Leptospira interrogans</i> serovar Canicola, cepa LC-NY	≥ 80 hámster PD ₈₀
<i>Leptospira interrogans</i> serovar Icterohaemorrhagiae, cepa LI-11403J	≥ 80 hámster PD ₈₀
Excipientes c.s.p.	1 dosis

INDICACIONES

En perros sanos como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por virus de Moquillo canino, Adenovirus canino Tipo 2, Parainfluenza canina, Parvovirus canino, *Leptospira* Canicola e Icterohaemorrhagiae y Coronavirus.

ESPECIE DESTINO

Perros

FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Transferir de forma aséptica el contenido del frasco vial con diluyente estéril al frasco vial de Procyon® Dog D2PPvL y mezclar con cuidado hasta que se disuelva.

Inyectar 1 mL por vía subcutánea o intramuscular en animales de 6 o más semanas de edad.

Repetir la dosis con intervalos de 2 a 4 semanas hasta que el perro tenga 12 semanas de edad.

Dosis de 1 mL se requieren para la inmunización primaria.

Se recomienda revacunaciones anuales con una dosis.



PRECAUCIONES, CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

No vacunar hembras gestantes
No mezclar con otras vacunas

Consulte al Médico Veterinario
Venta bajo fórmula del Médico Veterinario
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2°C a 7°C.
No congelar.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Estuche de 25 frascos de vacuna por 1 dosis.

FABRICADO POR

Intervet Inc.
Estados Unidos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia