



FICHA TÉCNICA

PORCILIS® PCV

Registro ICA No. 9132-BV

USO VETERINARIO

Organismo Modificado Genéticamente

1

COMPOSICIÓN

Cada dosis de 2 mL de suspensión inyectable contiene:

Antigeno de subunidad ORF2 de Circovirus Porcino Tipo 2

≥ 3.720 UA*

Excipientes c.s.p

2 mL

*Unidades Antigénicas determinadas en la prueba de potencia in vitro (AlphaLISA)

INDICACIONES

Para la inmunización activa de cerdos con el fin de reducir la carga viral y eliminación del Circovirus Porcino (PCV) Tipo 2. El uso de la vacuna resulta en un aumento de peso diario de cerdos afectados por PCVD durante el periodo de engorde.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: 22 semanas después de la vacunación

ESPECIE DESTINO

Porcinos

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión inyectable

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

1) En el caso de bajos niveles de anticuerpos maternos contra PCV-2 o cuando PCVD es diagnosticada en cerdos en una edad tardía, una sola vacunación es recomendada:

Administrar (una dosis de 2 ml), por inyección intramuscular en el cuello detrás de la oreja, a partir de una edad de 3 semanas.

2) En el caso cuando se espera que niveles más altos de anticuerpos maternos contra PCV-2 estén presentes, administrar por inyección intramuscular en el cuello detrás de la oreja, de acuerdo con el siguiente esquema:

La primera inyección (2 ml) puede ser administrada desde una edad de 3-5 días, la segunda inyección (2 ml) 2 a 3 semanas después.



PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

La vacuna es un producto líquido y listo para utilizar.

Antes de utilizar la vacuna, permita que alcance la temperatura ambiente (15 °C - 25 °C) y agite bien antes de su uso.

Agitar bien antes de utilizar.

Utilizar jeringas y agujas estériles.

Evitar la introducción de contaminación.

Evitar el uso de equipo de vacunación con partes de caucho.

La seguridad del producto no ha sido establecida durante el embarazo o lactancia.

No hay información disponible sobre la compatibilidad de esta vacuna con cualquier otra. Por lo tanto, la seguridad y eficacia del producto cuando utilizado con cualquier otro producto (ya sea cuando es utilizado el mismo día o en tiempos diferentes) no han sido demostradas.

No mezclar con otra vacuna o producto inmunológico.

ADVERTENCIAS

Vacunar animales sanos únicamente.

Efectos adversos

Puede ocurrir un aumento transitorio de la temperatura corporal después de la vacunación. Algunos lechones pueden mostrar depresión y disminución en consumo de alimento por algunos días. Puede haber una reacción local transitoria en el sitio de aplicación en forma de inflamación dura y algunas veces caliente, que disminuye en pocas semanas.

En casos muy raros (menos de 1 en 10,000 animales) reacciones tipo anafiláctico pueden ocurrir, que pueden ser significar riesgo para la vida del animal. En estos casos, se requiere tratamiento.

Para el usuario:

Este producto contiene aceite mineral. La inyección accidental/auto-inyección puede resultar en dolor e inflamación severos, particularmente si inyectado en una articulación o dedo, y, en casos raros, podría resultar en la pérdida del dedo afectado si no se proporciona atención médica oportuna.

Si usted es inyectado de forma accidental con este producto, busque asesoría médica oportuna incluso si una cantidad muy pequeña es inyectada y lleve el inserto del empaque con usted.

Si el dolor persiste por más de 12 horas después del examen médico, busque atención médica de nuevo.

Para el médico:

Este producto contiene aceite mineral. Incluso si cantidades pequeñas han sido inyectadas, la inyección accidental con este producto puede causar inflamación intensa, que puede, por ejemplo, resultar en necrosis isquémica e incluso la pérdida de un dedo. Atención quirúrgica especializada y OPORTUNA es requerida, y puede requerir la incisión e irrigación temprana del área inyectada, especialmente donde existe el compromiso de la pulpa del dedo o tendón.

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos



ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 2 °C - 8°C.
No congelar. Proteger de la luz.

Vida útil después de abrir el recipiente por primera vez: 8 horas

3

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Frasco por 20 mL (10 dosis), 50 mL (25 dosis), 100mL (50 dosis), 200mL (100 dosis) y 500 mL(250 dosis).

FABRICADO POR

Intervet International B.V.
Países Bajos

IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.
Bogotá, Colombia